


わがいやあし病気のはなしシリーズ 14

糖尿病予備群

—血糖値が気になり始めたら—



日本臨床内科医会

もくじ

糖尿病予備群とは、どんな状態？	1
こんな人は、糖尿病予備群かも	
「まだ予備群だから...」、その油断が禁物	3
本物の糖尿病になると大変！	4
からだが消耗していく	
深刻な合併症が起ってしまう	5
いろいろな生活上の制約が加わってしまう	6
予備群の人が守るべきこと	7
食事のとり方を見直しましょう	
からだを動かす習慣をつけましょう	10
肥満や太り気味の解消と予防	11
上手な気分転換でストレス解消	12
予備群の人は、定期検診を続けること	13

わかりやすい病気のはなしシリーズ 14

糖尿病予備群～血糖値が気になり始めたら～ 第1版第1刷
2001年9月発行

発行：日本臨床内科医会
〒101-0062東京都千代田区神田駿河台2-5
東京都医師会館3F 303
tel：03-3259-6111 fax：03-3259-6155

編集：日本臨床内科医会学術部

後援：日清ファルマ株式会社(日清製粉グループ)
〒101-8441
東京都千代田区神田錦町 1-25
TEL.03-5282-6530 FAX.03-5282-6151

糖尿病 予備群とは、 どんな状態？

糖尿病の一步手前の状態が、糖尿病予備群です。血液中の糖分（ブドウ糖）の濃度「血糖値」が高いのが糖尿病ですが、ふつうの人よりも血糖値が少し高いものの、まだ本当の糖尿病の域には達して

いない、いわば、糖尿病のなりかけ状態です。

こんな人は、糖尿病予備群かも…

糖尿病予備群を見つけ出すには、いくつかの方法があります。

1 予備群には、以下の条件にあてはまる人がなりやすいのです。

- 血縁者に糖尿病の人がいる
- 検診で血糖値が高めとか、尿糖が出ているといわれたことがある
- 巨大児の出産や、流産、死産を繰り返した女性
- 食べすぎや飲みすぎの習慣がある人
- 太っている人
- 若いのに歯周病がひどい人
- おできなどができて治りの悪い人





2 実際に医師が診断する場合には、次の手段で**糖尿病予備群**と判定します。

- 糖尿病は一般に、症状とブドウ糖負荷試験で診断されます。ブドウ糖負荷試験では、正常型、境界型、糖尿病型の三種類のどれかに判定されますが、境界型と判定された人が、糖尿病予備群です。

75g ブドウ糖負荷試験による血糖値の判定

判定区分	糖液を飲む前	飲んで2時間後
正常型	110mg/dL未満	そして 140mg/dL未満
境界型	正常型でも糖尿病型でもないもの	
糖尿病型	126mg/dL以上	または 200mg/dL以上

- かぜやストレス状態が続いたときにだけ尿糖が出たり、血糖値が上昇する場合：予備群ではこういう特殊な状態でない限り、血糖値は空腹時ならほぼ正常範囲にありますし、食後でもわずかに高くなる程度です。
- HbA_{1c}*が5.6～6.0%の場合。

HbA_{1c}：ヘモグロビンエーワンシー。過去1～2カ月の血糖値の平均を示し、糖尿病の診断、コントロールの指標となる検査です。基準値は、4.3～5.8%です。

「まだ予備群だから…」、その油断が禁物

パターンを続けていると、血糖が次第に高くなって、いつの間にか本物の糖尿病になってしまうのです。

予備群の段階なら自覚症状は全くありませんし、7ページ以降にあげるような、割合と簡単な努力でふつうの人の状態に戻ることも可能です。しかし、油断したり甘く考えて、それまでの生活

また、血糖値が高めで血圧や血中コレステロールが高い場合、動脈硬化がより進行しやすくなります。このため、糖尿病でなくて予備群の段階でも、脳卒中や心臓病を起こすことがあります、最近増えているケースとして、医学的に注目されています。



自分はまだ予備群だからと油断してはいけません。

- ①予備群の人は、数年以内に糖尿病になりやすいという傾向が認められています。
- ②糖尿病の合併症の一つである動脈硬化は、予備群の段階から進行します。

本物の 糖尿病に なると大変!

エネルギー

栄養

ひとたび糖尿病になってしまうと、大変な事態が待ち受けています。

1 からだが消耗していく

血糖が高くなると、体内の栄養やエネルギーが無駄に浪費されて、からだをやつれてきます。そして、尿糖が出る、のどや口が渇く、尿が頻繁に出る、体重が減る、だるくて疲れやすくなる、勃起しにくくなる、足などにしびれや痛みが生じる、視力が衰える…などの症状が現れます。

2 深刻な合併症が起こってしまう

糖尿病が大変な病気だと恐れられているのは、「合併症」を起こすからなのです。合併症は、一度現れると、進行の勢いを止めるのはなかなか難しいのです。

● **網膜症**… 眼の奥の網膜に眼底出血を起こしたり硝子体出血を引き起こし、視力が低下します。現在、国内で毎年3,000人以上が糖尿病網膜症で光を失っていて、成人の失明原因のトップです。

● **腎症**… 血液中の老廃物を排泄するという腎臓の機能が徐々に低下していき、やがて尿毒症を起こし、人工透析を受けないと命にかかわるようになります。現在国内で毎年1万人以上が糖尿病性腎症で人工透析を開始していて、ほかの原因を押しつけて第1位を占めるようになりました。

● **神経障害**… 手足のしびれや痛みをはじめとする、ありとあらゆる神経系の症状や障害が起きて、毎日が苦痛で悩まされます。胃腸の障害、立ちくら



み、勃起障害のほか、心筋梗塞が起きても痛みを感じないなど、多彩な障害が起こります。

- 動脈硬化**…動脈の壁が硬くなったり、血液が流れる部分が狭くなる結果、臓器の血液が不足して、狭心症や心筋梗塞、脳卒中をはじめ、足の壊疽えいそなどが起きます。



3 いろいろな生活上の制約が加わってしまう

糖尿病になってしまうと、予備群の状態では想像もつかないほどの制約が起こります。

- 糖尿病の治療のために、食事療法や運動療法を毎日正確に実行する必要が生じます。
- 医師が指示する間隔で、定期的な通院が必要になります。
- 多くの場合、血糖を下げるために薬を服用したり、インスリンの自己注射を行う必要が生じます。そのほか、合併症に対する治療も必要になります。

これらのため、時間的、経済的な負担がとて増えてしまうのです。いいかえれば、予備群の状態にとどめておかないで糖尿病の状態にしてしまうことは、“大きな損をする”ことになるのです。

予備群の人が 守るべきこと

それでは、糖尿病の予防法を伝授しましょう。糖尿病を予防する生活は、ほかの生活習慣病の予防・改善、動脈硬化の防止にもなります。

① 食事のとり方を見直しましょう


血糖値を上げないためには、食べすぎないことが基本ですが、同じ量を食べても血糖値が上がりやすい食べ方と、上がりにくい食べ方があります。

- **ゆっくり食べる**…早食いをすると、食べた物が早く腸に到達するので、血糖値が急上昇します。また、早食いでは食べすぎになりがちです。
- **朝食を欠かさず、1日3食**…食べる回数が少ないと、1回に食べる量が多くなり、食後の血糖値がより高くなります。
- **いろいろな素材をとり混ぜて食べる**…品数が少なく栄養バランスが偏った料理は、短時間で消化吸収されるため、血糖値が上がりやすくなります。逆に、いろいろなものを少しずつとりそろえて食べ

ると、消化吸収に時間がかかり、血糖値は上がりにくくなります。

● **血糖値の上昇を抑えるものをメニューに入れる…**

野菜やきのこ・海藻、精製度の低い穀物などは、食物せんいが豊富で、血糖値の急な上昇を抑えてくれます。また、血糖値を上げにくくする特定保健用食品を利用する方法もあります(次ページ参照)。



**バランスの良い食事は、
血糖値の上昇を抑える**


特定保健用食品をかしこく利用

最近、血糖値への効果を示した特定保健用食品が、厚生労働省の許可のもと販売されています。粉末をお湯に溶かしてスープにして、食事と一緒に飲むものなどです。

これらの食品を利用すると、食後の血糖値の上昇が緩やかになります。その効果は、食後にインスリンが大量に分泌されるのを抑えることにもつながり、すい臓の働きを助けて、予備群の人が糖尿病へ移行するのを遅らせることも期待できます。

ただし、過信は禁物です。生活習慣の改善と定期検査を忘れずに。なお、糖尿病と診断されている人は、主治医に相談してから使用してください。

特定保健用食品の素材「0.19小麦アルブミン」を食事と一緒に摂取した場合の食後血糖値・血中インスリン濃度の変化



〔森本聡尚・他：小麦アルブミン添加スープによる食後血糖上昇の調節。健康・栄養食品研究Vo.1, No.2, 1-6, 1998〕

- **寝る前には食べない**…寝る前に食べるとエネルギーが消費されず、貯蓄に回って太ります。食事はからだを動かす前に食べるのが原則。なるべく就寝3時間前までに夕食を。
- **腹八分目**…満腹感を得ようとしない。
- 高カロリーの油物などは少なめに
- 間食、食後のデザート、果物、アルコールなどの食べすぎ飲みすぎに注意



2 からだを動かす習慣をつけましょう

日ごろの運動量が少ないと、体内でブドウ糖が処理されにくくなり、血糖値が上がりやすくなります。積極的にからだを動かすようにしましょう。なにも本格的なスポーツでなくても、生活の中でからだを動かすチャンスを見つければよいのです。

一番よいのは「歩くこと」です。手軽にできて、そのうえ糖尿病予防に効果的な運動です。通勤の際に電車やバスを一つ手前の駅・停留所で降りたり、買い物で少し遠回りしてみたりと、ちょっと工夫をして歩く機会を見つけてください。1日30分ぐらいの早歩きを3週間も続ければ、歩くのが楽しくなるはずです。

3 肥満や太り気味の解消と予防

糖尿病の人の8割は現在肥満か、過去に肥満の時期があった人だといわれています。そして肥満は糖尿病だけでなく、あらゆる生活習慣病を起こしやすくします。それらの病気の予防には、太らないことや、肥満の解消がなによりです。




4 上手な気分転換でストレス解消！


精神的なストレスも、血糖値を上げる重要な要因です。といっても現代社会には避けようのないストレスが多いので、上手に気分転換する術^{すべ}を身につけましょう。趣味やレジャーのほか、ボランティア活動などもよい方法です。



予備群の人は、 定期検診を 続けること

糖尿病予備群の人は、とくに自覚症状がないので、そのままの状態だとどまっているのか糖尿病になってしまっているのかは、自分では全くわかりません。ですから、なるべく一定の医療機関(かかりつけ医)を決めて、少なくとも毎年1回は検診を受けることが絶対に必要です。





医院名